

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DIP 23-5-73 528700

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU-CHARENTES

CHARENTE, CHARENTE-MARITIME, DEUX-SÈVRES, VIENNE

12, rue Victor-Hugo - 86 - POITIERS - Tél. : (49) 41.35.55

ABONNEMENT ANNUEL ^{30 F.} ~~25 F.~~
C. C. P. LIMOGES 4.752.22 W.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
12, rue Victor-Hugo - 86 - POITIERS

BULLETIN n° 152 - supplément n° 2 - MAI 73

VIGNE

BLACK-ROT

Les organes de reproduction sont mûrs et les prochaines pluies déclencheront des projections d'ascospores, alors que les vignes sont à un stade sensible (plusieurs feuilles étalées).

Dans le Haut-Poitou où la lutte est obligatoire, effectuer un traitement. Dans les autres régions traiter également les vignes atteintes l'an passé ou situées au voisinage de vignes abandonnées.

ARAIGNEES ROUGES

Les éclosions sont nombreuses. Le moment est venu d'effectuer un traitement dans les secteurs où elles sont observées.

Vérifier leur présence et traiter si l'observation à la loupe sur plusieurs feuilles permet de constater qu'elles sont en nombre moyen de 15 formes mobiles ou plus par feuille.

POMMIERS - POIRIERS

TAVELURES

En raison du développement de la végétation, renouveler le traitement dans les jours à venir.

OIDIUM du POMMIER

Les conditions climatiques sont favorables à cette maladie qui a commencé à s'étendre. Ajouter un produit anti-oidium dans la bouillie anti-tavelure si des attaques sont observées.

ARAIGNEES ROUGES

cf. vigne et ne traiter que si une moyenne de 20 formes mobiles par feuille est notée.

ALLIACEES

(ail, poireaux, ...)

TEIGNE DU POIREAU

Les cultures d'ail attaquées par les chenilles ont été observées ces derniers jours. Pour lutter contre ce parasite, utiliser l'un des produits suivants :

P. 114

- | | | |
|--------------------|------------------|---|
| - azinphos..... | : 40 g de MA/hl, | |
| - carbaryl..... | : 75 g | " |
| - chlorfenvinphos. | : 40 g | " |
| - lindane..... | : 30 g | " |
| - phosalone..... | : 60 g | " |
| - parathion éthyl | : 25 g | " |
| - parathion methyl | : 40 g | " |

CRIOCERE des ALLIACEES

Les adultes sont rouges et les pontes situées sur les limbes sont constituées de 5 à 10 oeufs alignés. Les larves qui ont un aspect gélatineux noirâtre dévorent les feuilles.

Les traitements indiqués contre la teigne du poireau sont efficaces contre le criocère.

ROSIERS

OIDIUM

L'oïdium commence à s'installer sur les pousses. Pour arrêter le développement de cette maladie, effectuer une pulvérisation avec du soufre micronisé ou du dinocap (Karathane) à dose préconisée par les fabricants.

On peut encore utiliser du benomyl : 30 g de MA/hl d'eau, (60 g de Benlate).

PUCERONS et TORDEUSES

Pour lutter contre les pucerons qui épuisent les pousses et contre les tordeuses qui agglomèrent les feuilles et les endommagent, ajouter à la bouillie anti-oïdium un insecticide : parathion, phosalone.

On pourra leur préférer un produit à base d'isolane (Primine 10) ou de pirimicarbe (Pirimor).

Ces deux derniers insecticides épargnent les coccinelles.

NOTE - Pour le mélange de produits contre l'oïdium et contre les pucerons, tenir compte des indications des fabricants.

---oo0oo---

Le Chef de la Circonscription
Phytosanitaire
"Poitou - Charentes"

F. BARBOTIN

Les Ingénieurs chargés des
AVERTISSEMENTS AGRICOLES

A. GRAVAUD
R. HUDE - B. MORIN

Imprimé à la Station le 16 mai 1973 - Préc. note : Bull. 152-sup. n°1